

## ХИМИТЕК АНТИСЕПТИК-СПРЕЙ

### жидкое нейтральное низкопенное дезинфицирующее средство многоцелевого назначения

Предназначено для санитарно-гигиенической обработки кожных покровов персонала и различных поверхностей из любого материала, инвентаря, оборудования, предметов обстановки, одежды, обуви в лечебно-профилактических учреждениях, включая обработку рук хирургов, гигиеническую обработку рук персонала машин скорой помощи, обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, обработку локтевых сгибов доноров, обработку кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, а также в организациях и учреждениях, где предписана антисептическая обработка. Рекомендуется для применения в быту. Эффективно в отношении патогенной микрофлоры различной этиологии – бактериальной, вирусной и грибковой.

Действующие вещества: поли(гексаметиленбигуанид)гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид.

Для областей применения, где предписано использование спиртовых дезинфектантов, предлагается гелеобразное средство **ХИМИТЕК АНТИСЕПТИК-ГЕЛЬ**. Для мытья и обеззараживания рук, а также любых твёрдых поверхностей, включая посуду, рекомендуется мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом **ХИМИТЕК СВЕЖЕСТЬ-АНТИСЕПТИК**.

### Микробиологическая активность

Эффективно против грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулёза, вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов, герпеса, полиомиелита, ВИЧ и др.), проявляет фунгицидное действие (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон).

### Назначение

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи, обработка рук хирургов;
- обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, обработка локтевых сгибов доноров, обработка кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;
- гигиеническая обработка рук персонала детских дошкольных и школьных учреждений, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений;
- гигиеническая обработка рук персонала предприятий общественного питания, пищевой и химико-фармацевтической промышленности, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.);
- гигиеническая обработка рук персонала парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов, массажных кабинетов и т.п.), коммунальных объектов, культурно-развлекательных учреждениях, банках и гостиницах, в банях, бассейнах, фитнес-центрах и других учреждениях, где требуется антисептическая обработка кожных покровов, а также в быту;
- дезинфекция различных поверхностей из любого материала, инвентаря, оборудования, предметов обстановки, одежды, обуви, резиновых и полипропиленовых коврик на предприятиях разного профиля, в том числе пищевых и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, парфюмерно-косметических, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, в учреждениях образования, культуры, спорта и отдыха, пенитенциарных, социального обеспечения, детских учреждениях, на объектах ветеринарного надзора, в быту.

### Особенности

- может применяться для обработки кожных покровов детей;
- обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов;
- не оказывает пересушивающего, аллергического и раздражающего действия на кожу;
- не имеет специфического запаха.

### Состав

Вода 30% и более; поли(гексаметиленбигуанид)гидрохлорид <5%; дидецилдиметиламмоний хлорид <5%; алкилдиметилбензиламмоний хлорид <5%; неионогенные ПАВ <5%.



## Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость без специфических запахов. Показатель pH 6,0–7,5.

## Экология

Избегать попадания концентрата в почву и водоёмы.

## Форма поставки

Средство поставляется в бутылках с распылителем 50 мл и 0,5 л, в бутылках 1 л, а также в канистрах 5 л.

## Способ применения

Гигиеническая обработка рук. 3 мл средства нанести на руки и втирать до высыхания в течение 30 секунд. При подозрении на наличие туберкулёзной палочки – не менее 1 минуты.

Обработка рук хирургов. На предварительно очищенные руки нанести дважды по 5 мл средства и втереть в кожу. Общее время обработки составляет 3–5 минут.

Обработку объектов и поверхностей из любых материалов проводят методом протирания и распыления. После дезинфекционной выдержки 3–5 минут, не допуская высыхания средства, протереть поверхность стерильной марлевой салфеткой. Ориентировочный расход средства – 20–40 мл на 1 м<sup>2</sup>.

Указания по обработке кожи операционного поля, инъекционного поля, локтевых сгибов донора, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов содержатся в Инструкции по применению дезинфицирующего средства многоцелевого назначения **ХИМИТЕК АНТИСЕПТИК-СПРЕЙ** № 2/09 от 20.07.2009 ФГУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена Росмедтехнологий».

При неоднократном использовании средства в течение рабочей смены для персонала, имеющего чувствительную кожу рук или склонность к аллергическим реакциям, перед очередным применением рекомендуется тщательно вымыть руки с жидким мылом ХИМИТЕК СВЕЖЕСТЬ.

## Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки. Использовать только для наружного применения.

При попадании в глаза рекомендуется промывание проточной водой. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10–15 измельчённых таблеток активированного угля на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за врачебной помощью.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с данным продуктом приведена в паспорте безопасности.

## Хранение

Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 40°C в помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия окружающей среды, вдали от источников тепла и возгорания, отдельно от лекарств, в местах, не доступных детям. Избегать хранения на прямом солнечном свете. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до –20°C. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 2,5 м, а для групповых упаковок – 1,5 м. Срок годности – 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.