ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) ХИМИТЕК АНТИСЕПТИК

жидкое нейтральное беспенное средство для дезинфекции рук

Предназначено для обработки кожи инъекционного и операционного полей пациентов, локтевых сгибов доноров, рук хирургов и других медицинских работников, участвующих в выполнении оперативных вмешательств; для гигиенической обработки, в том числе в зонах чрезвычайных ситуаций и санпропускниках, кожных покровов медицинского персонала медицинских организаций любого профиля, персонала машин скорой помощи, санаторно-курортных, детских дошкольных и школьных учреждений, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и объектов по изготовлению и реализации пищевой продукции, предприятий парфюмерно-косметической и химико-фармацевтической промышленности, объектов торговли, коммунальной и общественно-социальной сферы, транспорта, других учреждений и организаций, а также в быту. Не оказывает пересушивающего, аллергического и раздражающего действия на кожу. Эффективно в отношении бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, включая коронавирусы. Готовая для применения форма продукта.

Действующее вещество: изопропиловый спирт.

Микробиологическая активность

Эффективно против грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек (тестировано на Escherichia coli), бактерий возбудителей стафилококка (тестировано на Staphylococcus aureus), туберкулёза (тестировано на культуре тест-штамма M. terrae) и внутрибольничных инфекций (тестировано на Pseudomonas aeruginosa); грибов (тестировано на Candida Albicans); вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов B, C, D, ВИЧ-инфекции, коронавирусной инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции (тестировано на Adenovirus человека 5 типа).

Назначение

- антисептическая обработка кожи инъекционного и операционного полей пациентов, локтевых сгибов доноров, рук хирургов и медицинских работников, участвующих в выполнении оперативных вмешательств;
- гигиеническая обработка кожных покровов медицинского персонала медицинских организаций любого профиля, персонала машин скорой медицинской помощи, санаторно-курортных, детских дошкольных и школьных учреждений;
- гигиеническая обработка рук работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, объектов по изготовлению и реализации пищевой продукции;
- гигиеническая обработка рук сотрудников парфюмерно-косметических и химико-фармацевтических предприятий, объектов торговли, коммунальной и общественно-социальной сферы, транспорта, других учреждений и организаций;
- гигиеническая обработка рук в быту.

Особенности

- не оставляет липкости на коже рук;
- не требует смывания;
- сохраняет стабильность микробиологической активности при хранении.

Состав

Изопропанол 70–73 масс. %; вода 15% или более, но менее 30%; пропиленгликоль <5%; глицерин <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим спиртовым запахом. Показатель pH 6,0–8,5.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Способ применения

Гигиеническая обработка рук – нанести на кожу до полного увлажнения или не менее 3 мл средства и равномерно втирать до высыхания, но не менее 30 секунд.

Обработка кожи инъекционного поля – нанести до полного увлажнения кожи или протереть стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством; время выдержки после обработки – 1 минута.

Указания по применению дезинфицирующего средства **ХИМИТЕК АНТИСЕПТИК** содержатся в Инструкции № 1/2020 от 13.07.2020 г., утверждённой НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека при введении в желудок и нанесении на кожу средство относится к 4-му классу (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Использовать только по назначению. Избегать попадания в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

При попадании в глаза рекомендуется промыть их проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При попадании в желудок выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с добавлением 10-15 таблеток измельчённого активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Не принимать внутрь! Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем, включёнными нагревательными приборами.

Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от –20 до 30°С вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 5 лет при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.